

إرشادات للوالدين بشأن الدواء الأولي للأطفال

سيتلقى طفلك مهدئاً في المرة القادمة قبل تلقي علاج الأسنان. يهدف الدواء الأولي إلى تقليل توتر الطفل وخوفه أثناء العلاج. كما أنه يريح العضلات

.يستغرق التأثير مدة ثلاث ساعات، عند بعض الأطفال فترة أطول

قبل العملية

يجب عدم تناول الطعام لمدة 4 ساعات وعدم الشرب لمدة ساعتين (يجب عدم شرب عصير الليمون الفردوسي (قبل أو بعد العملية

تشكل بعض الأدوية أو الأمراض عقبة أمام الاستخدام الآمن للدواء الأولي - أخبر طبيب الأسنان عن أدوية طفلك وأمراضه وحساسيته قبل العملية

بعد العملية

يجب مراقبة الطفل في أول ثلاث ساعات

لا ينبغي ترك الطفل بمفرده ويجب تجنب اللعب القوي

لا يُسمح للطفل باستخدام الدراجة الهوائية في يوم العملية

يجب عدم السماح للطفل باستخدام السلالم بمفرده في يوم العملية

لا يمكن اصطحاب الطفل إلى روضة الأطفال بعد العملية

من الشائع ألا يتذكر الطفل جيداً ما حدث أثناء العلاج. من الجيد بعد ذلك مناقشة ما حدث بنبرة إيجابية لأن الطفل قد يجد أن ذاكرته غير مريحة للغاية

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، أو نزيف استثنائي، أو غثيان أو قيء، أو إذا كنت تعتقد أن الموقف غير واضح ، فيرجى الاتصال برقم حجز مواعيد علاج الأسنان 116 117 أو بقسم الطوارئ.