

Kohdunsuun kypsyttely ballonkimenetelmällä

Potilasohje


Sinulle on laitettu ballonki-katetri kohdunkaulakanavan läpi kohdun sisäsuulle kohdunsuun kypsyttämiseksi.

Kypsyttelyn tarkoituksena on saada kohdunsuuta avautumaan niin, että synnytys voidaan käynnistää kalvojen puhkaisulla tai synnytyksen käynnistämiseen tarkoitetuilla lääkkeillä.

Ballonkimenetelmä

Ballonki-katetri on asetettu kohdunkaulakanavaan, jossa sen keittosuolaliuoksella täytetty pää nojaa kohdun sisäsuulle. Ballongin nojautuminen sisäsuulle kypsyttää kohdunsuuta. Ballogin katetri roikkuu vapaana ja voit vetää itse katetrasta noin kahden tunnin välein, pitääksesi aktiivista vetoa yllä.

Ballongin ollessa paikoillaan, myös sikiön pää työntää ballonkia alaspäin, saaden kohdunsuuta kypsytettyä.



Ballonki-katetrin laiton jälkeen

Ballongin ollessa paikoillaan voit liikkua normaalisti. Sikiön liikkeitä tulee seurata normaaliin tapaan.

Ballonki-katetri tippuu pois kohdunsuulta yleensä seuraavaan aamuun mennessä. Kohdunsuulta tippuneen katetrin voi hävittää normaalisti sekajätteen mukana. Jos katetri on aamulla edelleen paikoillaan, voit lisätä vetoa kohdunsuulle.

Ole yhteydessä synnytysvastaanottoon 014-269 1204:

- Jos katetri tippuu pois kohdunsuulta ennen klo 20:tä
- Jos sinulta menee lapsivesi
- Jos sinulla on kuumetta, kovaa jatkuvaa kipua, jatkuvaa kirkasta verenvuotoa tai sikiö ei liiku normaalisti.

Jatkohoito

Ballongin laittoa seuraavana päivänä, sinun täytyy tulla synnytysvastaanotolle. Synnytysvastaanotolla lääkäri tekee suunnitelman jatkohoidon suhteen.

Mikäli ballonki-katetri on vielä paikoillaan, lääkäri poistaa sen.

Kysyttävää

Jos sinulla on kysyttävää voit aina soittaa synnytysvastaanotolle 014–2691204.