

# Lantion alueelle sädehoitoa saavat miespotilaat

## Sädehoidon vaikutus seksuaalisuuteen

Muutokset seksuaalisuuden alueella ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Sädehoito voi aiheuttaa väsymystä, mikä vähentää sukupuolista halukkuutta. Sairauden aiheuttama henkinen paine vaikuttaa myös halukkuuteen.

## Sivuvaikutuksia

Kivesten alueelle annettu sädehoito vähentää siittiöiden liikkuvuutta ja tuotantoa ja sen vuoksi huonontaa hedelmöittämiskykyä.

Sädehoito voi aiheuttaa impotenssia, mikä saattaa kuitenkin korjaantua.

Rakkaus, sen osoittaminen, sekä läheisyys ovat parisuhteessa tärkeitä, vaikka ei olisikaan erektiokykyä. Avoin ja rehellinen keskustelu sukupuolielämän ongelmista, toiveista ja odotuksista puolison, elämänkumppanin, ystävän tai lääkärin kanssa auttaa tilannetta. Seksuaalista kanssakäymistä ei pidä välttää, vaan korvata yhdyntä hyväilyllä ja hellyydellä edes yrittämättä varsinaista yhdyntää.