

Panacod® - postoperatiivisen kivun hoitoon

Kauppanimi

Panacod® 500/30 mg, tabletti

Vaikuttava aine

Parasetamoli (500 mg) ja kodeiini (30 mg)

Markkinoija

CNX Therapeutics

Annostus ja käyttöön liittyvät huomiot

Toimenpiteen jälkeisen voimakkaamman kivun hoitoon ohjeen mukaan, tarvittaessa 1-2 tablettia 1-4 kertaa vuorokaudessa.

Tabletit niellään nesteen kanssa.

Lääke voidaan ottaa yhtäaikaan tulehduskipulääkkeen kanssa, esim. ibuprofeeni.

Panacodia ei saa käyttää samaan aikaan muiden parasetamolia sisältävien valmisteiden kanssa, esim. Para-Tabs®, Panadol®, Pamol®, Paramax®.

Mahdolliset haittavaikutukset

Panacod® sisältää kodeiinia, jonka vaikutus tulee keskushermoston kautta. Lääke voi etenkin suurina annoksina väsyttää sekä heikentää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa. Muita keskushermostoa lamaavia aineita, kuten alkoholia ja uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, ei tulisi käyttää Panacodin® kanssa yhtäaikaan, koska ne voimistavat Panacodin® rauhoittavaa sekä mahdollista hengitystä lamaavaa vaikutusta.

Saattaa aiheuttaa pahoinvointia ja ummetusta.

Sappivaivaisille voi aiheuttaa sappikohtauksen.

Parasetamolin ja alkoholin yhteiskäyttö lisää maksaan kohdistuvia haittoja sekä maksavaurion riskiä.

Lähteet

Duodecim lääketietokanta: Panacod® valmisteyhteenveto

2.10.2024