

PTC (perkutaaninen transhepaattinen kolangiografia)

Sinulle on varattu aika PTC-toimenpiteeseen eli dreenin laittoon sappiteihin tai sappiestenttin laittoon Sairaala Novan kuvantamisyksikössä.

Saapuessasi sairaalaan ilmoittaudu kutsukirjeessä saamasi ohjeistuksen mukaisesti.

Toimenpiteen esivalmistelujen jälkeen sinut viedään kuvantamiseen toimenpiteeseen. Toimenpide tehdään sedaatiassa. Jälkihoito tapahtuu samassa yksikössä, jossa tehdään esivalmistelut.

Toimenpiteeseen valmistautuminen

- Ohessa laboratoriolähete, käy verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa lähetteessä merkittynä päivämääränä. Verikoetulokset eivät saa olla enempää kuin kolme vuorokautta vanhat.
- Mikäli sinulla on käytössä Marevan- tai Warfarin lääkitys, käy toimenpidettä edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
- Mikäli sinulla on käytössä **verenohennuslääkitys, on lääkitys tauotettava ennen toimenpidettä**. Saat tauotusohjeet lähettävästä yksiköstä. Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.
- Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
- **Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti toimenpidepäivän aamuna.** Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
- **Ota mukaasi käyttämäsi reseptilääkkeet.**
- Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai olet raskaana, ota yhteys lähettävään yksikköön.
- **Saat syödä ja juoda edellisenä päivänä klo 24.00 asti, minkä jälkeen tulee olla syömättä ja juomatta ennen toimenpidettä.** Lääkkeet voit ottaa pienen vesimäärän kanssa.
- **Autolla ajaminen on kielletty toimenpidepäivänä.**
- Mikäli olet yliherkkä lääkeaineille, mainitse tästä henkilökunnalle saapuessasi toimenpiteeseen.

Jälkihoito

Olet neljä (4) tuntia vuodelevossa ja seurannassa toimenpiteen jälkeen. Olet tarvittaessa seurannassa seuraavaan aamuun.

Hoito kotona

Kotona tulee välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista viikon ajan toimenpiteen jälkeen. Ota yhteys omaan terveyskeskukseen, jos myöhemmin ilmenee toimenpiteeseen liittyviä ongelmia, esimerkiksi kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön / Hyvaks puhelinvaihteeseen puh. (014) 269 1811, mikäli:

- sinulla on sydämen keinoläppä
- haluat kysyä verenohennuslääkityksen tauotuksesta
- haluat kysyä insuliinihoitoisen diabeteksen hoidosta
- olet raskaana
- olet yliherkkä jodivarjoaineelle
- **sinulle annettu aika ei sovi.** Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta saatamme joutua perimään erikseen määrätyn maksun.

Ota yhteys kuvantamiseen puh. (014) 269 1248 klo 8.00–14.30, mikäli:

- haluat kysyä jotain tutkimukseen liittyvää