

Sappirakon poisto tähystämällä, poistettavat ompeleet

Leikkauksen jälkeinen kipu

Tähystysleikkauksen jälkeen saattaa esiintyä haavakivun lisäksi hartiapistosta muutamana päivänä ja vatsa voi olla hieman turvoksissa. Sekä hartiapistokseen että haavakipuun voit käyttää ilman reseptiä tai reseptillä saatavia kipulääkkeitä annostusohjetta noudattaen.

Ruokailu

Ensimmäisinä päivinä leikkauksen jälkeen voi esiintyä pahoinvointia. Tarvittaessa saat mukaan pahoinvointilääkkeen. Ruokailu kannattaa aloittaa kevyesti pienin aterioin. Asteittain voit siirtyä normaaliin ruokailuun.

Haavan hoito

Vatsan alueella on 4–5 pientä haavaa. Haavat on suljettu poistettavin ompelein. Vuorokauden kuluttua toimenpiteestä voit poistaa haavatyynt ja käydä suihkussa. Leikkaushaavojen suojaksi riittää huokoinen haavateippi. Mikäli haava tihkuttaa verta, laita haavan päälle huokoinen haavateippi ennen suihkuun menoa. Jos haavan ympäristö on verinen, laita haavateippi vasta suihkun jälkeen. Pidä teippejä haavoilla yhden viikon ajan toimenpiteestä, vaihda tarvittaessa.

Ompeleiden poisto viikon kuluttua omassa terveyskeskuksessa. Varaa itse aika. Saunaan voit mennä ompeleiden poiston jälkeisenä päivänä.

Liikunta

Liikunta kannattaa aloittaa kevyesti ja rasitusta asteittain lisäten. Kevyt päivittäinen ulkoilu ja liikunta sairausloman aikana vähentävät vatsan turvotusta ja edistävät paranemista. Vältä raskaita nostoja sairausloman ajan.

Ota yhteyttä omalle terveysasemalle, jos toimenpiteen jälkeen

- kipu on voimakasta eivätkä kipulääkkeet auta
- haavalla on infektion merkkejä (lisääntyvää kuumotusta, turvotusta, punoitusta, eritystä)
- kuume nousee ($>38^{\circ}$)
- haava aukeaa tai haavasta vuotaa jatkuvasti verta

Suosittelemme yhteydenottoa digitaalisesti osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa

Sivustolle pääset myös QR-koodin kautta.



